

適用拡大農薬

関西グリーン研究所 製

注：登録内容を一部変更して記載している場合があります。(例：200L/10a→200ml/m²)
 注：使用に際しては取扱説明書で内容をご確認ください。
 注：魚毒性については取扱い説明書の注意書きをご確認ください。

2012.11.16～2013.3.15

変更(追加)部分は斜体・太字

農薬	商品名 (種類名)	対象芝草	使用回数	使用方法	申請業者	毒性	
	有効成分(%)	対象病害虫・雑草 使用目的					使用時期
殺菌剤	グリーンワークWP シアリファミド・ホリチン水和剤 シアリファミド (20.0) ホリチン (9.0)	ベントグラス (生産圃場限定が外れる) 葉腐病(ブツバツ) ビシウム病 炭疽病 赤焼病	6回以内 発病初期	散布 2000倍・500m ² /l 1000倍・250m ² /l 1000倍 250m ² /l	石原産業 科研製薬	普	
	リゾトップ (フラメトビル水和剤) フラメトビル(50.0) ダブルイーグル	日本芝 疑似葉腐病 (春はげ症) ブルーグラス	3回以内 発病初期	散布 0.1g/m ² 100-300ml/m ²	住化グリーン	普	
	トルカドスチル・フタトビと水和剤 トルカドスチル(40.0)フタトビ (2.5)	雪腐小粒菌核病	3回以内 根雪前	散布 200倍 200m ² /l	住化グリーン	普	
	アグリマイン-100 オキサリデンピリン・メトキサロニル水和剤 オキサリデンピリン (2.8)・メトキサロニル (18.8)	ベントグラス (生産圃場) かさ枯病	8回以内 発病前～ 発病初期	散布 500倍 500m ² /l	ファイザー	普	
	除草剤	アシュラスター液剤 アピラム・MDBAカカミ塩液剤 アピラム(30)・MDBAカカミ塩(3.3)	日本芝(のしぼ)	3回以内	茎葉散布又は 全面土壌散布 0.45-0.75m ² /l 200-300m ² /l	シンジェンタ ジャパン 保土谷UPL ユービーエル ジャパン	普
			一年生広葉雑草 メヒシバ	春夏期雑草 発生初期			
			一年生雑草	秋冬期雑草 発生初期			
日本芝(こらいしぼ)			3回以内				
		一年生雑草	雑草発生初期				